

## Вирусный гепатит «В».

Вирусный гепатит «В» - это вирусное инфекционное заболевание печени. Характеризуется медленным развитием болезни, длительным течением, приводящим к циррозу и раку печени.

Источником инфекции является больной человек и вирусоноситель. Вирус в крови больных находится задолго до появления первых клинических симптомов болезни, а также весь острый период (3-4 недели до появления желтухи). Также вирус присутствует у больных и носителей вируса в слюне, сперме, вагинальном секрете. Заболевание передаётся:

- от матери к ребёнку во время родов, если мать инфицирована;
- от ребёнка к ребёнку, если они используют одну жевательную резинку и т.п.;
- в случае использования нестерильных иглолок при инъекциях, косметических манипуляциях;
- при общем использовании лезвий для бритья, зубных щёток;
- при незащищённых половых отношениях.

Большую эпидемиологическую опасность для детей представляют родители – «здоровые носители вируса». Они легко могут инфицировать детей при тесном контакте. Высока опасность инфицирования детей в организованных детских коллективах.

Ежегодно гепатит «В» уносит жизни 900 тыс. человек. Это заболевание особенно опасно для новорождённых, т.к. инфицируясь в раннем возрасте, человек является носителем инфекции до конца жизни, может заражать других людей.

Введение вакцины против гепатита «В» детям в раннем возрасте помогает защитить их от указанных выше проблем. По сути, это первая в мире противораковая вакцина. От болезни защищает введение 3-х доз вакцины по схеме:

V<sub>1</sub> – в роддоме в 1 день жизни,

V<sub>2</sub> – через 1 месяц,

V<sub>3</sub> – через 5 месяцев после V<sub>2</sub>.

Для проведения иммунизации против гепатита «В» используются специальные самоблокирующиеся шприцы, что делает прививку безопасной.

Ввиду серьёзности гепатита «В» и учитывая высокую эффективность и безопасность вакцины, ВОЗ рекомендует её введение всем детям планеты.

Материал подготовлен: Стеценко Е.В.